

# KAĶU HIPERTIROĪDISMA DIAGNOSTIKA

Aizdomas par hipertiroīdismu: anamnēze, klīniskā izmeklēšana, +/- atbilstošas bioķīmijas rādītāju izmaiņas

Izmeklējiet TT4

TT4 virs normas

TT4 normas robežās

~ 10% hipertiroīdu kaķu TT4 ir normas robežās.

Iespējamie iemesli:

- Agrīna/viegla hipertiroīdisma gadījumos TT4 daudzums svārstās - virs normas /normas robežās
- TT4 supresija kādas konkurējošas/nevairogdziedzera saslimšanas dēļ

Ja joprojām ir aizdomas par hipertiroīdismu izvēlieties vienu no šīm iespējām

Ja aizdomas par agrīnu/vieglu hipertiroīdismu – 2-4 nedēļas pēc pirmā izmeklējuma /kad attīstījušās izteiktākas klīniskās pazīmes - atkārtojiet TT4

Vienā paraugā izmeklējiet BrīvoT4 un TT4

Brīvais T4 virs normas robežās

Brīvais T4 normas robežās

TT4 normas robežās  
(augstākajos 50%)

TT4 normas robežās  
(zemākajos 50%) vai zem  
normas

Hipertiroīdisms

Hipotiroīdisms ticams

Hipotiroīdisms maz ticams

Hipotiroīdisms maz ticams

Iespējama netiroīda saslimšana (gremošanas trakts, jaunveidojums)  
Ja joprojām aizdomas par hipertiroīdismu – izmeklējiet TSH (veicot suņu TSH) vai sūtiet uz vairogdziedzera scintigrāfiju