

Kods	Profila nosaukums	Kad izvēlas šo profilu?	Profilā ietvertie izmeklējumi	Izm. laiks	Cena, EUR bez PVN
1167	Lielais fekāliju profils (sunim, kaķim)	Plašai akūtas vai neskaidras izcelsmes diarejas diagnostikai.	Bakterioloģija un mikoloģija: aerobā bakterioloģija un mikoloģija; obligāti un fakultatīvi patogēnās baktērijas, tostarp <i>Salmonella</i> bagātināšanas kultūra; gāzi producējošās baktērijas. Klostridiju toksīni: <i>Clostridium perfringens</i> enterotoksīns; <i>Clostridioides difficile</i> toksīni A un B. Parazitoloģija: endoparazīti. Antigēna noteikšana (EIA): <i>Giardia</i> antigēns.	2–3 d. d.	103,40
167	Mazais fekāliju profils (sunim, kaķim)	Diarejas sākotnējai pamata izmeklēšanai.	Bakterioloģija un mikoloģija: aerobā bakterioloģija un mikoloģija; obligāti un fakultatīvi patogēnās baktērijas, tostarp <i>Salmonella</i> bagātināšanas kultūra; gāzi producējošās baktērijas. Parazitoloģija: endoparazīti.	2–3 d. d.	54,45
1163	Kombinētais fekāliju profils (sunim, kaķim)	Diarejas gadījumā, ja ir aizdomas arī par viēšņu infekciju.	Bakterioloģija un mikoloģija: aerobā bakterioloģija un mikoloģija; obligāti un fakultatīvi patogēnās baktērijas, tostarp <i>Salmonella</i> bagātināšanas kultūra; gāzi producējošās baktērijas. Parazitoloģija: endoparazīti. Antigēnu noteikšana (EIA): <i>Giardia</i> un <i>Cryptosporidium</i> antigēni.	2–3 d. d.	97,90
1662	Kucēnu/kaķēnu fekāliju profils	Kucēnam vai kaķēnam ar akūtu vai atkārtotu diareju.	Bakterioloģija un mikoloģija: aerobā bakterioloģija un mikoloģija; obligāti un fakultatīvi patogēnās baktērijas, tostarp <i>Salmonella</i> bagātināšanas kultūra; gāzi producējošās baktērijas. Parazitoloģija: endoparazīti. Antigēnu noteikšana (EIA): parvovīrusa un <i>Giardia</i> antigēni.	2–3 d. d.	86,35
8168	Diarejas ierosinātāji (sunim)	Aizdomas par vīrusu vai viēšņu izraisītu diareju sunim.	PQR: koronavīruss, parvovīruss, cirkovīruss, <i>Giardia</i> un <i>Cryptosporidium</i> .	1–3 d. d.	113,30
8168	Diarejas ierosinātāji (kaķim)	Aizdomas par vīrusu vai viēšņu izraisītu diareju kaķim, īpaši <i>Tritrichomonas</i> infekciju.	PQR: koronavīruss, <i>Tritrichomonas foetus/blagburni</i> , <i>Giardia</i> , parvovīruss un <i>Cryptosporidium</i> .	1–3 d. d.	113,30
8921	Hemorāģiskas diarejas profils (sunim)	Sunim ar akūtu asiņainu diareju.	Bakterioloģija: bakterioloģiskā izmeklēšana, tostarp <i>Salmonella</i> . PQR: parvovīruss; <i>Clostridium perfringens</i> netE un netF gēni; patogēnās <i>E. coli</i> grupas EHEC, EPEC un ETEC.	1–3 d. d.	145,20

1290	Disbiozes profils (sunim)	Hronisku vai atkārtotu gremošanas traucējumu un iespējamās disbiozes izvērtēšanai sunim.	Mikrobioma analīze: galveno zarnu mikrobioma baktēriju, tostarp anaerobu, kvantitatīva noteikšana ar PĶR. Mikoloģija. Fekāliju biomarkēri: α-1-antitripsīns, sekretorais IgA (sIgA), kalprotektīns un aizkuņģa dziedzera elastāze. Parazitoloģija: endoparazīti.	1–7 d. d.	156,20
1290	Disbiozes profils (kaķim)	Hronisku vai atkārtotu gremošanas traucējumu un iespējamās disbiozes izvērtēšanai kaķim.	Mikrobioma analīze: galveno zarnu mikrobioma baktēriju, tostarp anaerobu, kvantitatīva noteikšana ar PĶR. Mikoloģija. Fekāliju biomarkēri: α-1-antitripsīns, sekretorais IgA (sIgA) un kalprotektīns. Barības sagremošanas izvērtēšana: mikroskopiska barības sagremošanas izmeklēšana. Parazitoloģija: endoparazīti.	1–7 d. d.	156,20
1504	BARF fekāliju profils	Dzīvniekiem, kuri saņem jēlu gaļu vai BARF barību.	Bakterioloģija: <i>Salmonella</i> , <i>Yersinia</i> , <i>Campylobacter</i> un <i>Listeria</i> . Parazitoloģija: endoparazīti. * Izm. laiks <i>Yersinia</i> līdz 28 dienām	2–6 d.d.*	86,90
1507	Patogēno baktēriju fekāliju profils	Aizdomas par patogēnu vai zoonotisku bakteriālu infekciju.	Bakterioloģija: <i>Salmonella</i> , <i>Yersinia</i> un <i>Campylobacter</i> . PĶR: patogēnās <i>E. coli</i> grupas EHEC, EPEC un ETEC, ietverot virulences faktorus STa, STb, LTb, stx1, stx2 un eae. * Izm. laiks <i>Yersinia</i> līdz 28 dienām	2–6 d.d.*	97,90
8027	Cilvēkiem patogēni diarejas ierosinātāji	Nepieciešama mērķēta nozīmīgāko cilvēkiem patogēno caurejas ierosinātāju pārbaude.	PĶR: <i>Salmonella</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> un <i>Campylobacter jejuni</i>	1–3 d. d.	75,35

Fekāliju parauga savākšana un uzglabāšana:

- Savākt svaigas fekālijas tīrā, cieši noslēdzamā fekāliju konteinerā., piem. Laboklin fekāliju konteiners. Konteineru piepildīt aptuveni līdz ¾.
- Parazitoloģijai un periodiski izdalītiem ierosinātājiem ieteicams trīs secīgu dienu kopparaugs, īpaši *Giardia*, koronavīrusa un *Trichomonas* diagnostikai.
- Līdz sūtīšanai uzglabāt ledusskapī 2–8 °C temperatūrā.
- Bakterioloģiskai izmeklēšanai paraugu vēlams paņemt pirms antibiotiku terapijas sākšanas.

Sūtīšanas cena uz Laboklin Vācijā: 16.00 EUR + PVN

Cenas norādītas neietverot PVN un tās ir spēkā no 06.2026. Ar pilnu LABOKLIN izmeklējumu katalogu var iepazīties [ŠEIT!](#)

Speciālos LABOKLIN fekālos konteinerus ar triecienizturīgu sekundāro iepakojumu un absorbējošo materiālu bioloģiski drošai transportēšanai varat saņemt Vetfondā! Jautājumu gadījumā rakstiet laboratorija@vetfonds.lv vai zvaniet mob.29555186